

# 热搜

隐翅虫

6月4日,有网友晒出自己被隐翅虫“毁容”的照片,引起网友关注。相关话题冲上网络热搜榜首。

■文字来源:央视财经、中国消防、央视网、@央视新闻  
■图片来源:视觉中国、央视网  
■整合:陈楚仪

## 遇到这种虫子



## 千万别拍, 已有人“毁容”



### 红火蚁

红火蚁有重复蜇刺的能力,被其叮咬后有如火灼伤般的疼痛感,其后会出现如灼伤般的水泡。少数人对毒液中的毒蛋白过敏,会有过敏性休克甚至死亡的风险。

应对方法:

被叮咬后,可用盐水或肥皂水清洗患处,再用外敷药涂抹,一旦出现全身过敏反应,应尽快到医院就诊。



### 恙虫

恙虫叮咬时会分泌一种酶使人麻痹,皮肤被恙虫叮咬后基本都会产生焦痂。恙虫病潜伏期为4-21天,首发症状是高热,除了眼睛红,会有皮肤红肿、四肢麻痹、恶心嗜睡等症状,严重者会多器官功能衰竭致死。

应对方法:

不要随意坐在草地上,注意保护身体暴露部位。如果野外活动后出现长时间高热不退,且腰、腋窝、腹股沟等处发现焦痂,应及时就医。



### 蚊子

蚊子叮咬皮肤时分泌有毒唾液,引起局部红肿、痒痛,甚至会因此感染登革热、疟疾、脑炎等。

应对方法:

若被蚊子叮咬,可在伤口涂抹碱性的肥皂水,或用水冲洗。既安全放心,也能及时软化红肿缓解痒痛。

### 它号称“飞行硫酸”

提起隐翅虫,不少人都表示这种虫子太可怕。隐翅虫号称“飞行硫酸”,温馨提示:遇到它千万千万不能拍!它的体内有强酸性毒液,沾到皮肤上可引起剧烈灼痛,造成皮肤起泡及溃烂。

隐翅虫又被称为“影子虫”“青腰虫”,每年的6月至9月,隐翅虫会大规模地出现,夏秋季雨后是其活跃的时期。

隐翅虫分布范围广,几乎遍布世界,喜潮湿环境。在农田、林间、雨林、山地、河畔及海边等地方都能见到隐翅虫的身影。隐翅虫有趋光性,夜间会向灯光处飞行。

隐翅虫之所以号称是“飞行硫酸”,是因为有毒的隐翅虫身体内能够分泌出一种酸性在pH值1-2的毒液,从这个数值就能看出毒液的酸性很强。毒隐翅虫体液中的毒素与人体皮肤接触就会引起毒隐翅虫皮炎。

### 它怎样感染人体皮肤?

隐翅虫的品种数以万计,目前我国已报道的毒隐翅虫有21种,主要种类有奇异毒隐翅虫、黑足毒隐翅虫和黄足毒隐翅虫。

不少网友都表示被隐翅虫叮咬过。

隐翅虫体液感染人体皮肤的途径有三种:1.直接把虫体揉碎在皮肤上所致,称为直接感染;2.虫体的碎片污染了手指,再由手指去摸其他部位导致感染,称为间接感染;3.虫子隐藏在衣物、洗脸巾中,使用时虫体不小心被搓烂使毒液沾在上面,接触皮肤后导致感染。

隐翅虫皮炎是指皮肤接触隐翅虫体内毒液后所致的接触性皮炎。临床表现为接触毒液数小时到2天后局部出现条状、片状或点簇状水肿性红斑、水疱或脓疱等,可发生糜烂、结痂及表皮坏死,有瘙痒、灼痛和灼热感。

### 被隐翅虫灼伤怎么办?

发现隐翅虫停留在皮肤上:千万不要拍打它。正确的做法是轻轻吹走它,或者甩掉它,然后用清水或碱性肥皂水洗净接触过隐翅虫的皮肤。

如果隐翅虫出现在家中,可以用胶带粘住,或用纸巾捉住扔掉,注意不要接触到毒液。

当前正处于隐翅虫大规模出现时期,要注意做好以下事项:1.到公园、郊区、乡村等地时,要穿长袖长裤,并随身携带驱蚊虫用品;2.可以采取各种驱蚊虫措施,如喷杀虫剂或在身上涂驱蚊剂等;3.家中定期清扫,保持室内外环境清洁,防止隐翅虫滋生;4.家里要安装纱门、纱窗。晚上家里不要开太强的灯光;尽量不“摸黑”玩手机,以免吸引隐翅虫;5.睡觉前检查床上是否有隐翅虫,以免压到。



请收好这份夏季防虫手册

夏季毒虫活跃,人遭到叮咬易感染多种疾病,严重可危及生命。蝉虫、隐翅虫、蜈蚣……这里有一份最全防虫手册及应对方法,请收好!



### 蜱虫

4-10月是蜱虫的活跃期,它们喜欢将头埋入人皮肤内吸血。蜱虫身上携带着病原体,被蜱虫叮咬后,叮咬部位会出现发炎破溃及红斑等症状,严重或致被叮咬者高烧不退,并发多器官功能衰竭,甚至危及生命。人被咬伤后,通常有7-15天的潜伏期。

应对方法:

大家可以随身携带驱蚊水,最好不要在草地上久坐或久卧。若发现身上有蜱虫,不要硬拽,以防其嘴上倒刺深入体内。正确的做法是先用酒精涂抹,再用镊子取出,记住不可用手直接接触。



### 毛毛虫

很多毛毛虫的体表长有毒毛。被蜇伤后,皮肤会出现刺痛灼感,皮肤表面变红肿,甚至化脓溃烂,严重者还可引起荨麻疹等全身不良反应。

应对方法:

被蜇伤后立即用胶布或透明胶带反复多次粘去皮肤处的毒毛,清除毒毛后及时用清水或肥皂水冲洗。若未缓解,应及时去医院就诊,千万不要因为痒痒用手去抓。



### 螨虫

在潮湿的夏季螨虫更易滋生。一旦被螨虫叮咬,易引起炎症,伤口出现米粒或黄豆粒大小的丘疹、斑疹等。

应对方法:

家居环境要注意通风换气,保持干燥,被褥勤洗勤换勤晒。被叮咬后,可服用抗组胺药,涂抹解毒剂,若继发感染需考虑使用抗生素。



### 跳蚤

跳蚤往往会躲藏在人体腰部、头发等部位,吸食人血。被它叮咬后,伤口会出现红疹子,红肿痒痛大概持续7-15天才会消退。

应对方法:

注意家庭卫生,经常开窗通风,及时清洗床品和衣物。若家有宠物,要经常给宠物洗澡。